



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2024

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑ.Λ

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 31.

**A2.** (α) Αν  $x_1, x_2, \dots, x_n$  είναι οι τιμές μιας μεταβλητής  $X$ , που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους  $n$  με  $k \leq n$  τότε στη τιμή  $x_k$  αντιστοιχίζεται η (απόλυτη) συχνότητα  $\nu_k$ , δηλαδή ο φυσικός αριθμός που δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή  $x_k$  της εξεταζόμενης μεταβλητής στο σύνολο των παρατηρήσεων.

(β') Αν σε κάθε τιμή  $x_1, x_2, \dots, x_n$  δώσουμε διαφορετική βαρύτητα που εκφράζεται με τους λεγόμενους συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας)  $w_1, w_2, \dots, w_n$  τότε ο σταθμικός μέσος δίδεται απ' τον τύπο:

$$\bar{x} = \frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k w_k}{\sum_{k=1}^n w_k}$$

**A3.** (α') Λ

(β') Λ

(γ') Σ

(δ') Σ

**ΘΕΜΑ Β**

- B1.** Η συνάρτηση  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x + \frac{1}{3}$  είναι παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  (ως πολυωνυμική) με παράγωγο  $f'(x) = x^2 + 6x + 5$ .
- B2.** Για την  $f'$  ισχύει  $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1 = 36 - 20 = 16$  και άρα οι ρίζες αυτής είναι οι  $x_1 = 5$  και  $x_2 = 1$ . Τότε,

$x$	$-\infty$	1	5	$+\infty$	
$x - 1$	-	0	+	+	
$x - 5$	-	-	0	+	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Άρα,  $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 1] \cup [5, +\infty)$  και  $f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1, 5]$ . Συνεπώς, η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(-\infty, 1]$ , γνησίως φθίνουσα στο  $[1, 5]$  και γνησίως αύξουσα στο  $[5, +\infty)$ . Τέλος, παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο  $x_1 = 1$  ίσο με  $f(1) = \frac{8}{3}$  και ολικό ελάχιστο στο  $x_2 = 5$  ίσο με  $f(5) = -8$ . Διαγραμματικά, ο πίνακας μονοτονίας φαίνεται παρακάτω.

$x$	$-\infty$	1	5	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

- B3.** Η εξίσωση της εφαπτόμενης της  $C_f$  στο  $x_0$  είναι η  $y = \lambda x + \beta$ . Ο συντελεστής διεύθυνσης είναι  $\lambda = f'(0) = 5$ . Άρα,

$$y = 5x + \beta \quad (1)$$

Το σημείο  $M(0, f(0)) = (0, \frac{1}{3}) \in (1)$  άρα

$$\frac{1}{3} = 0 + \beta \Leftrightarrow \beta = \frac{1}{3}$$

Επομένως, απ' την (1) παίρνουμε ότι η εξίσωση της ζητούμενης εφαπτόμενης είναι  $(\varepsilon) : y = 5x + \frac{1}{3}$ .

**B4.** Είναι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} \stackrel{\text{ορισμός παραγώγου}}{=} f'(-1) = (-1)^2 + 6 \cdot (-1) + 5 = 12$$

## ΘΕΜΑ Γ

Οι παρατηρήσεις είναι οι 22, 18,  $20 + \kappa$ , 14, 16 όπου  $\kappa \in \mathbb{R}$ . Είναι CV = 20%.

**Γ1.** Είναι  $s = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+7)(x-1)}{2(x-1)} = \frac{8}{2} = 4$  διότι το τριώνυμο  $x^2 + 6x - 7$  έχει  $\Delta = 6^2 - 4 \cdot (-7) \cdot 1 = 36 + 28 = 64$  και άρα  $x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-6 \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 1} = \frac{-6 \pm 8}{2} = \begin{cases} x_1 = -7 \\ x_2 = 1 \end{cases}$

**Γ2.**  $CV = \frac{s}{|\bar{x}|} \Leftrightarrow 0.2 = \frac{4}{|\bar{x}|} \Leftrightarrow |\bar{x}| = \frac{4}{0.2} \Leftrightarrow |\bar{x}| = 20 \Leftrightarrow \bar{x} = \pm 20$ .

**Γ3.** • Αν  $\bar{x} = 20$ , τότε:

$$\bar{x} = \frac{22 + 18 + 20 + \kappa + 14 + 16}{5} \Leftrightarrow 20 = \frac{90 + \kappa}{5} \Leftrightarrow \kappa = 10$$

• Αν  $\bar{x} = -20$ , τότε:

$$\bar{x} = \frac{22 + 18 + 20 + \kappa + 14 + 16}{5} \Leftrightarrow -20 = \frac{90 + \kappa}{5} \Leftrightarrow \kappa = -190$$

η οποία απορρίπτεται ως μη ρεαλιστική.

Για την εύρεση της διαμέσου του δείγματος διατάσσουμε αυτό σε αύξουσα σειρά 14, 16, 18, 22, 30. Επειδή το πλήθος των παρατηρήσεων είναι περιττό, η διάμεσος θα είναι η μεσαία παρατήρηση, δηλ.  $\delta = 18$ .

- Γ4. Έστω  $\bar{y}$  η μέση τιμή μετά την αύξηση κατά 10% και  $s'$  η τυπική απόκλιση μετά την αύξηση κατά 10%. Είναι  $c = 1.1$ . Τότε,

$$\bar{y} = c\bar{x} \Leftrightarrow \bar{y} = 1.1 \cdot 20 = 22 \quad (1)$$

$$s' = cs \Leftrightarrow s' = 1.1 \cdot 4 = 4.4 \quad (2)$$

Άρα, ο νέος συντελεστής μεταβολής είναι  $CV' = \frac{s'}{\bar{y}} = \frac{4.4}{22} = 0.2$ .


## ΘΕΜΑ Δ

- Δ1. Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο OAB είναι:

$$OB^2 + OA^2 = AB^2 \quad (1)$$

Όμως,  $OA = x$ ,  $OB = y$  και  $AB = 10$ . Συνεπώς, η (1) δίδει:

$$y^2 + x^2 = 100 \Leftrightarrow y^2 = 100 - x^2 \quad (2)$$



Όμως,  $y > 0$  άρα  $y = \sqrt{100 - x^2}$ . Για να ορίζεται η τελευταία παράσταση πρέπει  $100 - x^2 > 0 \Leftrightarrow (10 - x)(10 + x) > 0$ . Κατασκευάζουμε το πίνακα προσήμου:

$x$	$-\infty$	$-10$	$10$	$+\infty$
$10 - x$	+	0	+	-
$10 + x$	-	0	+	+
$(10 - x)(10 + x)$	-	0	+	-

Συνεπώς,  $x \in (-10, 10)$  και επειδή  $x > 0$  έπεται  $x \in (0, 10)$ . Άρα, το πεδίο ορισμού της  $y = f(x) = \sqrt{100 - x^2}$  είναι το  $\mathcal{A} = (0, 10)$ .

**Δ2.** Η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $(0, 10)$  ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων. Είναι:

$$f'(x) = \left(\sqrt{100-x^2}\right)' = \frac{(100-x^2)'}{2\sqrt{100-x^2}} = \frac{-2x}{2\sqrt{100-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{100-x^2}}$$

Ο ρυθμός μεταβολής της  $f$  όταν  $x = 8$  ισούται με  $f'(8)$ , δηλ.

$$f'(8) = -\frac{8}{\sqrt{100-8^2}} = -\frac{8}{\sqrt{100-64}} = -\frac{8}{\sqrt{36}} = -\frac{8}{6} = -\frac{4}{3}$$

**Δ3.** Είναι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - 8}{x - 6} &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{100-x^2} - 8}{x - 6} \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(\sqrt{100-x^2} - 8)(\sqrt{100-x^2} + 8)}{(x - 6)(\sqrt{100-x^2} + 8)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(100-x^2) - 64}{(x - 6)(\sqrt{100-x^2} + 8)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{36 - x^2}{(x - 6)(\sqrt{100-x^2} + 8)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(6-x)(6+x)}{(x-6)(\sqrt{100-x^2} + 8)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x-6)(6+x)}{(x-6)(\sqrt{100-x^2} + 8)} \\ &= -\frac{12}{\sqrt{100-36} + 8} \\ &= -\frac{12}{16} \\ &= -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

**Δ4.** Είναι  $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{100-x^2}}$ . Επειδή  $0 < x < 10$  είναι  $f'(x) < 0$  για κάθε  $x \in (0, 10)$ . Συνεπώς, η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα. Παρατηρούμε ότι:

$$2.3 = x_1 < 2.8 = x_3 < 3.5 = x_2 \xrightarrow{f \text{ γνησίως φθίνουσα}} f(x_1) > f(x_3) > f(x_2)$$

και το συμπέρασμα έπεται.